

УЧАСТИЕ ПАТРОНАЖНЫХ МЕДСЕСТЕР

В ПРОФИЛАКТИКЕСЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Автор

Нуралиева Наргиза Бектурдиевна. Ассистент кафедры «Прапедевтики детских болезней, педиатрии и Высшего сестринского дела» Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии

Научный руководитель

Рустамова Хамида Елемесовна, профессор кафедры Общественного здоровья, управления здравоохранением и физической культуры Ташкентского государственного стоматологического института (ТГСИ)

Профилактика болезней в рамках первичной медико-санитарной помощи имеет два основополагающих аспекта.



- Первый включает круг технических вопросов о действенности и приемлемости использования инструментов профилактики.
- Второй касается подходов в организации профилактической деятельности и включает, в том числе, распределение обязанностей персонала первичного звена, что до настоящего времени остается дискуссионным вопросом.

Цель исследования: определение степени участия патронажных медсестер в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний



Материал и методы исследования:

Проведен социологический опрос по разработанной нами анкете патронажных медсестер СП, ССП и СВП. Анкета для опроса медсестер содержала 26 вопросов с вариантами ответов. По каждому из вопросов предложено несколько вариантов возможных ответов. Всего опрошено 383 медсестер. Статистическая обработка результатов проводилась на персональном компьютере с использованием программ Microsoft Excel.

Результаты исследования:

Патронажные медсестры работающие СП, СВП и ССП в Хорезмской области



Какие медицинские услуги чаще проводились во время патронажа



- 97,9% отметили измерение артериального давления, при чем
- 95% опрошенных измеряют АД при каждом визите.
- почти все медсестры (98,4%) всегда с собой имеют прибор для измерения АД.

Какие заболевания ССС чаще всего встречаются?

- Гипертоническая болезнь
- Стенокардия
- Инфаркт миокарда




ДА



- 90,0% - фактор наследственности ССЗ
- 99,0% - О вреде курения для сердца
- 92,2% - Стрессы

Результаты



При выявлении симптомов ССЗ направляют:

- 78,9% в АПУ
- 11,2% в кардиологический центр
- 0,5% к знакомому врачу



И в 100% случаев контролируют выполнения предписания врача по поводу заболевания ССС.

ВЫВОДЫ:

- Проведенное исследование показало, что в вопросах профилактики ССЗ патронажные медсестры имеют достаточно знаний, но необходимо постоянное повышение их знаний в данном направлении.
- В условиях нехватки медицинских кадров, в частности врачей общей практики на местах, сестринский персонал, должен рассматриваться как ценный ресурс здравоохранения для предоставления населению доступной, приемлемой и экономически рентабельной помощи.
- В первичном звене здравоохранения при проведении мероприятий по профилактике и раннему выявлению неинфекционных заболеваний, в том числе ССС роль патронажной медсестры неопределима.